solventum

# 3M™ Prevena™ Therapie Scorecard

Datum: _____

Diagnose: _____

_____

## Anwendungsindikationen für das 3M™ Prevena™ Incision Management System

| ICD* | Patientenbezogene Risikostratifizierung | Orthopädie | | Plastische Chirurgie | | Herz- und Thoraxchirurgie | | Gefäßchirurgie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empfohlen Punktzahl | Punktzahl | Empfohlen Punktzahl | Punktzahl | Empfohlen Punktzahl | Punktzahl | Empfohlen Punktzahl | Punktzahl | |
| E66 | BMI > 35 kg/m² | 2[4] | | 1 | | 1 | | 2[1] | | |
| | BMI > 18,5 kg/m² | 1 | | | | | | 1 | | |
| | Non-ASA Antikoagulation | 1 | | 1 | | | | | | |
| F17 | Nikotinabusus | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
| E10; E11; E12; E13; E14 | Diabetes mellitus | 2[4] | | 1 | | 1 | | 2[1] | | |
| Z94 | Immundefizienz | 1 | | 1 | | | | | | |
| N18; N19 | Chronische Nierenerkrankung / Niereninsuffizienz | 1 | | 1 | | | | 2[1] | | |
| | Besiedelung der Nase mit Staphylococcus aureus | 1 | | 1 | | | | | | |
| J44 | Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Postoperative Bestrahlung | | | 1 | | | | | | |
| | Alter > 80 Jahre | | | | | 1 | | | | |
| | Alter > 50 Jahre[1] | | | | | | | 2[1] | | |
| E43; E44.0; E44.1; E64.0; R64; R63.3 | Mangelernährung (Albumin < 35 g/l, Protein < 65 g/l, Transferrin < 2 g/l)[1] | | | | | | | 1 | | |
| | Signifikante Bindegewebswucherung | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Summe** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |

# Anwendungsindikationen für das 3M™ Prevena™ Incision Management System

| ICD* | Patientenbezogene Risikostratifizierung | Orthopädie | | Plastische Chirurgie | | Herz- und Thoraxchirurgie | | Gefäßchirurgie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empfohlen Punktzahl | Punktzahl | Empfohlen Punktzahl | Punktzahl | Empfohlen Punktzahl | Punktzahl | Empfohlen Punktzahl | Punktzahl | |
| | Revisionsoperation | 2[4] | | | | 1 | | 1 | | |
| | Amputation über/unter dem Knie | 1 | | | | | | 1 | | |
| | Offene Reposition und interne Fixation von Frakturen (Acetabulum, Pilum, Calcaneus und Tibiaplaeau) | 1 | | | | | | | | |
| | Notoperation | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
| | Verlängerte Operationszeit (Gefäßchirurgie: Operationszeit > 142 Minuten)[1,3] | 1 | | 1 | | 1 | | 2[1] | | |
| | Traumatisiertes Weichgewebe | 1 | | | | | | 1 | | |
| | Kontaminationsrisiko | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Stark spannende Inzision | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Wiederholte Inzisionen | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Postbariatrische Bauchdeckenstraffung | | | 1 | | | | | | |
| | Brustrekonstruktion | | | 1 | | | | | | |
| | Nekrotisierende Fasziitis | | | 1 | | | | | | |
| | Sternotomie[3] | | | | | 1 | | | | |
| | Transfusion mit Hämoglobin < 8 mg/dl[1] | | | | | | | 1 | | |
| | Synthetische Graft-Implantationen | | | | | | | 1 | | |
| | Inzisionslänge > 8 cm | | | | | | | 1[1] | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Summe** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

*Codes entsprechen BfArM ICD-10-GM 2022.

**Ab >/= _____ Punkten ist die Anwendung des 3M™ Prevena™ Incision Management Systems zu empfehlen.**

**Kurzbegründung:**

- ☐ Vermeidung eines Revisionseingriffs
- ☐ Risikopatient aufgrund eines hohen Scores
- ☐ Sonstiges

**Patientenetikett:**

**Hinweis: Für Prevena Incision Therapy existieren spezifische Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen. Bitte machen Sie sich vor der Anwendung mit dem entsprechenden Handbuch für den Anwender des Prevena Incision Management Systems vertraut.**

**Disclaimer:** Der Inhalt der Prevena Therapy Scorecard wurde nach bestem Wissen und in Kooperation mit erstellt. Ihr Inhalt soll als Empfehlung dienen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Haftung der Solventum Medical Surgical bei der Verwendung der Scorecard wird ausgeschlossen.


1 Pleger SP, Nink N, Elzien M, Kunold A, Koshty A, Böning A. Reduction of groin wound complications in vascular surgery patients using closed incision negative pressure therapy (ciNPT): a prospective, randomised, single-institution study. Int Wound J. 2018;15(1):75–83. doi:10.1111/iwj.12836.
2 Kwon J, Staley C, McCullough M, et al. A randomized clinical trial evaluating negative pressure therapy to decrease vascular groin incision complications. J Vasc Surg. 2018;68(6):1744–1752. doi:10.1016/j.jvs.2018.05.224.
3 Willy C, Agarwal A, Andersen CA, et al. Closed incision negative pressure therapy: international multidisciplinary consensus recommendations. Int Wound J. 2017;14(2):385-398. doi:10.1111/iwj.12612.
4 Anatone AJ, Shah RP, Jennings EL, Geller JA, Cooper HJ. A risk-stratification algorithm to reduce superficial surgical site complications in primary hip and knee arthroplasty. Arthroplast Today. 2018;4(4):493-498. Published 2018 Oct 15. doi:10.1016/j.artd.2018.09.004


solventum


**Solventum Medical Surgical**
AT MedSurg-AT@solventum.com
CH MedSurg-CH@solventum.com
GE MedSurg-GE@solventum.com


**3M Health Care ist jetzt Solventum**


© Solventum 2024. Das S Logo und Prevena sind eingetragene Marken oder Warenzeichen von Solventum oder seinen Tochtergesellschaften. 3M und das 3M-Logo sind Marken von 3M. Andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. 42486